

Segundo Reporte

Seguimiento Fenómeno Desierto
Florido.

Parque Nacional Llanos de Challe

Elaborado por:

Administradora
Gabriela López Acosta

Equipo de Guardaparques
Fernando Mercader
Alberto Villegas
Leoncio Paredes
Sergio Araya



18 Julio 2017





*El **desierto florido** es un fenómeno que se produce en el **desierto** de Atacama (Chile), el más árido del planeta. El fenómeno consiste en la aparición de una gran diversidad de flores, en los años en que las precipitaciones son inusuales y superan el rango normal para el **desierto**. En el **Parque Nacional Llanos de Challe** estamos realizando un seguimiento del fenómeno, para conocer el avance y etapas de la floración.*



¿Cómo cuidar nuestro desierto florido?

- No corte las flores, sólo obsérvelas.
- No camine sobre los parches de vegetación, haga uso de los senderos establecidos.
- No pase por sectores de floración en vehículos ni motocicletas.
- No bote basura.



N

Ubicación Parcelas Parque Nacional Llanos de Challe.

Parcela Mina Oriente
Parcela El Fraile
Parcela Administración
Parcela Playa Blanca
Parcela Los Pozos

Para conocer el avance del fenómeno del desierto florido dentro del Parque Nacional, se realiza la toma de datos en diferentes parcelas representativas de cada sector.

Parcela: Guardería Administración.





Mirabilis elegans
(Buenas noches)



Viola polypoda
(Violeta de campo)



Leucocoryne narcissoides
(Narciso)



Schizanthus candidus
(Cacatúa, mariposa)

Parcela: Guardería Los Pozos.





Tristacma bivalve
(Lágrimas de la virgen)



Euphorbia thinophila
(Pichoga)



Nolana divaricata



Schizopetalon maritimum
(Clavelillo)

Parcela: Quebrada El Fraile





Mirabilis elegans
(Buenas noches)



Sicyos baderoa
(Calabacillo)



Leontochir ovallei (Garra de Leon) –
Mirabilis elegans (Buenas noches)



Argylia radiata (Terciopelo, flor del jote) –
Leucocoryne narcissoides (Narciso)



Encelia canescens
(Coronilla de fraile)



Aristolochia chilensis
(Oreja de zorro)



Argylia radiata
(Terciopelo, flor del jote)



Tetragonia marítima
(Aguanosa)



Parcela: Quebrada Mina Oriente





Adesmia argentea
(Varilla)



Leontochir ovallei (Garra de león)–
Sicyos baderoa (Calabacillo)



Fauna Asociada al Proceso de floración



Zenaida auriculata
(Tórtola)



Fauna Asociada al Proceso de floración



Liolaemus platei (Lagartija de plate)
– *Leontochir ovallei* (Garra de león)



Fauna Asociada al Proceso de floración



Geositta cunicularia (Minero)



Fauna Asociada al Proceso de floración



Phrygilus fruticeti (Yal hembra)